

Széketvizsgálatok

Széket vér kimutatás

- A mintavételt megelőzően semmilyen speciális diétára nincs szükség. (A teszt emberi vér specifikus.)
- A vizsgálat eredményét befolyásolhatja a vérző aranyér, menstruáció, bizonyos gyógyszerek (pl. aszpirin) és az alkoholfogyasztás.
- Ügyeljen rá, hogy a széklet a WC-csészében ne érintkezzen fertőtlenítő szerrel, vizelettel, illatosító szerekkel!
- A vér szakaszos ürülése miatt javasolt a háromszori, három egymást követő napi mintavétel.
- Mintavételi eszközt mintavételi helyünkön kérhet a vizsgálatot megelőző napokban, illetve a gyógyszertárakban is kapható erre a célra széketartály.



Kalprotektin vizsgálat (gyulladásos bélbetegség marker)

- A vizsgálat nem végezhető menstruáció alatt, a széklet vérrel történő kontaminációjának lehetősége miatt.
- Hasmenéses széklet a vizsgálatra nem alkalmas!

Széket tenyésztés

1. Mintavételre csak a frissen ürített széklet alkalmas.
2. A mintavételt a széklet kóros részéből (nyákos, gennyes, véres, híg vagy vizes) kell venni.

Minta tárolhatósága

- A levett **székletmintát minél hamarabb**, a mintavételtől számított **(maximum) 24 órán belül** le kell adni a laboratóriumban.
- Amennyiben tárolás szükséges, **+ 2-8 °C-on** (hűtőszekrényben) lehetséges. Semmiképp ne legyen kitéve a minta túl magas, illetve alacsony hőmérsékletnek!